Pequeños Rumiantes

Destete
PEQUEÑOS RUMIANTES

Alimento balanceado destinado a las categorías de corderos/chivitos, tanto para ser usado antes del destete (creep feeding) y como alimento post destete.
El alimento Destete acelera el pasaje desde la etapa lactante a rumiante, luego de la cual se continúa el plan nutricional con el alimento Engorde, cuando el objetivo sea la producción de corderos/borregos pesados.
Especialmente formulado con un cuidadoso balance vitamínico/mineral, contiene además un aditivo preventivo de las coccidiosis.

INDICACIONES:
Creep Feeding: Suministrar a voluntad, en sistema de comenderos en los cuales no pueda acceder su madre (a partir de los 30 días de vida).
Post Destete: Comenzar el plan alimentario con 100 g/animal/día de alimento Destete PR, acompañado de heno de pastura de excelente calidad. Incrementar a medida que se constate el consumo, hasta llegar a un máximo del 4% PV, no antes de las 2 semanas desde el comienzo del programa alimentario. En todo momento se debe mantener heno de pastura de excelente calidad.

COMPOSICIÓN	
Proteína	18,2%
TND	79,2%
Calcio	1,1%
Fosforo	0,5%
Cloruro de Sodio	0,50%
Vitamina A (UI)	3.150,0
Vitamina D (UI)	630,0
Vitamina E (UI)	4,2
Yodo (ppm)	0,6
Zinc (ppm)	42,0
Cobalto (ppm)	0,2
Cobre (ppm)	6,0
Manganeso (ppm)	45,4
Selenio (ppm)	0,3
Lasalocid (ppm)	22,5
Excipientes csp	1.000,0

Engorde
PEQUEÑOS RUMIANTES

Alimento balanceado destinado a las categorías de engorde, tanto para la producción de cordero/borrego pesado, como para el engorde de reproductoras refugo.
Formulado con una óptima relación calcio/fósforo y aporte de microminerales adecuados (Cobre), este alimento cuenta con el agregado de un acidificante preventivo de Urolitiasis.
Este alimento está especialmente indicado para suplementar reproductores de exposición.

INDICACIONES: Suministrar alimento Engorde a voluntad, previo período de acostumbramiento en forma gradual. Durante toda la etapa de engorde se suministrará fibra a discreción.
Para la preparación de reproductores, se debe suministrar a razón del 1,5-2% del peso vivo, sobre animales en pastoreo directo o que consuman forrajes conservados (rollos/silajes).

COMPOSICIÓN	
Proteína	13,8%
TND	79,1%
Cloruro de NH4	0,5%
Calcio	1,1%
Fosforo	0,4%
Cloruro de Sodio	0,50%
Vitamina A (UI)	2.100,0
Vitamina D (UI)	420,0
Vitamina E (UI)	2,8
Yodo (ppm)	0,5
Zinc (ppm)	35,0
Cobalto (ppm)	0,2
Cobre (ppm)	5,0
Manganeso (ppm)	37,8
Selenio (ppm)	0,3
Excipientes csp	1.000,0

Biofarma

Mantenimiento
PEQUEÑOS RUMIANTES

Alimento balanceado destinado a la suplementación de la majada en época de escasez de recursos forrajeros.
También indicado para diversas situaciones:

- Para realizar flushing energético pre servicio
- Prevenir la toxemia de la preñez (periparto)
- Suplementar durante el amamantamiento
- Suplementar durante encierres de trabajos en manga
- Suplementar recrías, asegurando el desarrollo adecuado
- Recuperar estado corporal en animales flacos

INDICACIONES: Suministrar entre el 1,5 – 2% del peso, dependiendo del estado nutricional de los animales, y calidad/cantidad de forraje disponible en libre acceso.

COMPOSICIÓN	
Proteína	12.4%
TND	76,3%
Calcio	1,2%
Fosforo	0,5%
Cloruro de Sodio	0,80%
Vitamina A (UI)	4.200,0
Vitamina D (UI)	840,0
Vitamina E (UI)	5,6
Yodo (ppm)	0,5
Zinc (ppm)	35,0
Cobalto (ppm)	0,2
Cobre (ppm)	5,0
Manganeso (ppm)	37,8
Selenio (ppm)	0,3
Excipientes csp	1.000,0

Concentrado 50%
PEQUEÑOS RUMIANTES

Suplemento pelleteado destinado a la elaboración de dietas para categorías de recría y engorde, utilizándolo en mezclas con maíz entero (u otro cereal) a razón de 50% maíz y 50% concentrado.
El Concentrado 50% realiza las correcciones proteicas/vitamínicas/minerales necesarias para cubrir los requerimientos nutricionales de las categorías en desarrollo y engorde.
Especialmente formulado con una adecuada relación Calcio/Fósforo, y niveles de microminerales (Cobre) óptimos para las categorías destinadas.
También posee el agregado de un acidificante, para prevenir la formación de Urilitiasis.

INDICACIONES: Para la preparación, se debe mezclar 50% maíz (u otro cereal) y 50% Concentrado 50%, suministrar la mezcla a discreción para las categorías de engorde (previo período de acostumbramiento). Durante toda la etapa de engorde se suministrará fibra a discreción.
Para la etapa de recría, la misma mezcla se debe suministrar a razón del 2% PV, sobre animales en pastoreo directo o que consuman forrajes conservados (rollos/silajes).

COMPOSICIÓN	
Proteína	19%
TND	71,6%
Cloruro de NH4	1,0%
Calcio	1,9%
Fosforo	0,6%
Cloruro de Sodio	1,00%
Vitamina A (UI)	4.200,0
Vitamina D (UI)	840,0
Vitamina E (UI)	5,6
Yodo (ppm)	1,0
Zinc (ppm)	70,0
Cobalto (ppm)	0,4
Cobre (ppm)	10,0
Manganeso (ppm)	75,6
Selenio (ppm)	0,5
Excipientes csp	1.000,0

Bv. de los Polacos 6446. C.P.: 5147 - Córdoba - Argentina. Tel./Fax: (54 3543) 422540
biofarma@biofarmaweb.com.ar - www.biofarmaweb.com.ar

Biofarma